

pLenti-REL-sgRNA

| 产品编号 | 产品名称 | 包装 |
|--------|------------------|-----|
| L03910 | pLenti-REL-sgRNA | 5μg |

产品简介:

- pLenti-REL-sgRNA (REL基因敲除质粒)是一种在动物细胞中可以同时表达Cas9、目的基因的sgRNA和puromycin抗性基因的质粒。用于在动物细胞中直接基于CRISPR/Cas9技术敲除目的基因，或者通过包装慢病毒后基于CRISPR/Cas9技术敲除目的基因。本质粒中sgRNA的有效性已经通过T7E1法的验证。
- 本质粒在细菌中为Amp抗性，全长约13,000bp。本质粒的关键图谱信息请参考图1。本质粒可直接转染细胞用于目的基因的CRISPR/Cas9敲除，以及通过puromycin筛选稳定细胞株；也可以与pMDLg、Rev及VSV-g共转HEK293T细胞进行重组慢病毒(lentivirus)的包装，然后再用于感染细胞或组织并进行目的基因的CRISPR/Cas9敲除。



图1. 表达sgRNA、Cas9和puromycin抗性的pLenti-sgRNA质粒关键图谱信息。

- 本质粒中的sgRNA基于碧云天研发的CRISPR/Cas9 sgRNA快速筛选和验证体系获得，sgRNA的有效性已经通过T7E1法验证。
- 本质粒用于实验时，建议同时选购无任何靶向的对照质粒pLenti-Control-sgRNA (L00011)或靶向GFP的对照质粒pLenti-GFP-sgRNA (L00013)。
- 碧云天同时提供基于CRISPR/Cas9技术的REL基因敲除的质粒(L03910 pLenti-REL-sgRNA)、慢病毒(L03911 REL Knockout Lentivirus)、HEK293T细胞(L03912 REL Knockout HEK293T Cells)、HEK293T敲除细胞的RIPA裂解液(L03913 REL Knockout HEK293T RIPA Lysate)、HEK293T敲除细胞的Trizol裂解液(L03914 REL Knockout HEK293T Trizol Lysate)等产品，具体请在碧云天网站查询或在本产品网点击相应产品。
- REL基因的基本信息如下：

| Species | Gene Symbol | Gene ID | GenBank Accession | Transcript |
|---------|-------------|---------|-------------------|------------|
| Human | REL | 5966 | BC117191 | NM_002908 |

| About the gene | |
|--------------------|---|
| Official Symbol | REL |
| Previous Symbol | - |
| Official Full Name | REL proto-oncogene, NF-kB subunit |
| Synonyms | I-Rel; c-Rel |
| Location | 2p16.1 |
| Gene Type | protein-coding gene |
| Uniprot ID | Q04864 |
| Pathway/Library | Oncogenes Library |
| Gene Summary | The REL gene encodes c-Rel, a transcription factor that is a member of the Rel/NFkB family, which also includes RELA (MIM 164014), RELB (604758), NFkB1 (MIM 164011), and NFkB2 (MIM 164012). These proteins are related through a highly conserved N-terminal region termed the 'Rel domain,' which is responsible for DNA binding, dimerization, nuclear localization, and binding to the NFkB inhibitor (MIM 164008) (Belguise and Sonenshein, 2007).[supplied by OMIM |

包装清单:

| 产品编号 | 产品名称 | 包装 |
|--------|------------------|-----|
| L03910 | pLenti-REL-sgRNA | 5μg |
| — | 说明书 | 1份 |

保存条件:

-20°C保存，至少两年有效。

组编辑突变检测试剂盒(D0508); 也可以通过相应的抗体进行检测。

- b. 对于单克隆细胞, 可通过PCR扩增出sgRNA靶向的基因片段后进行常规测序的方式进行验证, 同时也可以使用相应的抗体进行检测。

相关产品:

| 产品编号 | 产品名称 | 包装 |
|--------------|--|---------------|
| L00002-5µg | CRISPR/Cas9 Packaging Vectors Set A | 5µg/each |
| L00002-100µg | CRISPR/Cas9 Packaging Vectors Set A | 100µg/each |
| L00011-5µg | pLenti-Control-sgRNA | 5µg |
| L00011-100µg | pLenti-Control-sgRNA | 100µg |
| L00013-5µg | pLenti-GFP-sgRNA | 5µg |
| L00013-100µg | pLenti-GFP-sgRNA | 100µg |
| C0222 | 青霉素-链霉素溶液(100X) | 100ml |
| C0351-1ml | Polybrene (Hexadimethrine Bromide) | 1ml |
| C0351-50mg | Polybrene (Hexadimethrine Bromide) | 50mg |
| C0521 | Lipo293™转染试剂 | 0.5/1.5/7.5ml |
| C0526 | Lipo6000™转染试剂 | 0.5/1.5/7.5ml |
| C0533 | Lipo8000™转染试剂 | 0.5/1.5/7.5ml |
| D0378 | Stb13甘油菌 | 200µl |
| ST551-10mg | Puromycin Dihydrochloride (嘌呤霉素) | 10mg/ml×1ml |
| ST551-50mg | Puromycin Dihydrochloride (嘌呤霉素) | 10mg/ml×5ml |
| ST551-250mg | Puromycin Dihydrochloride (嘌呤霉素) | 250mg |
| ST1380-500mg | Polybrene (≥94%, Reagent grade) | 500mg |
| ST1380-2g | Polybrene (≥94%, Reagent grade) | 2g |
| ST1380-10g | Polybrene (≥94%, Reagent grade) | 10g |
| FF345-10pcs | 针头滤器(0.45µm/28mm, PES, Sterile, Sartorius分装) | 10个/袋 |
| FF345T-10pcs | 针头滤器(0.45µm/28mm, PES, Sterile, 进口分装) | 10个/袋 |
| FF345-50pcs | 针头滤器(0.45µm/28mm, PES, Sterile, Sartorius原装) | 50个/盒 |
| FF365-10pcs | BeyoGold™针头滤器(0.45µm/33mm, PES, Sterile) | 10个/袋 |
| FF365-100pcs | BeyoGold™针头滤器(0.45µm/33mm, PES, Sterile) | 100个/盒 |
| FF375-10pcs | BeyoGold™针头滤器(0.45µm/13mm, PES, Sterile) | 10个/袋 |
| FF375-100pcs | BeyoGold™针头滤器(0.45µm/13mm, PES, Sterile) | 100个/盒 |
| FUF158-2pcs | 超滤管(15ml, 100kDa MWCO, PES, Sartorius分装) | 2个/袋 |
| FUF158-12pcs | 超滤管(15ml, 100kDa MWCO, PES, Sartorius分装) | 12个/袋 |

Version 2020.12.09