



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology  
订货热线: 400-1683301或800-8283301  
订货e-mail: order@beyotime.com  
技术咨询: info@beyotime.com  
网址: http://www.beyotime.com

## NUPR1 Knockout HEK293T Cells

产品编号	产品名称	包装
L29267	NUPR1 Knockout HEK293T Cells	1支/瓶

### 产品简介:

- NUPR1 Knockout HEK293T Cells (NUPR1基因敲除HEK293T细胞)是通过同时表达Cas9、目的基因sgRNA和puromycin抗性基因，并实现了目的基因CRISPR敲除的HEK293T细胞。本细胞中目的基因的敲除已经通过T7EI法的验证。本细胞株是多克隆细胞，可用于该目的基因的生物学功能研究，也可以用于该基因相应抗体的验证。
- 本HEK293T Cells为可同时表达Cas9、puromycin抗性基因和目的基因sgRNA的慢病毒感染HEK293T细胞并经过puromycin筛选后获得的多克隆HEK293T细胞。制备本细胞的相应慢病毒的关键图谱信息请参考图1。




图1. 可同时表达sgRNA、Cas9和puromycin抗性的慢病毒其基因序列的关键图谱信息。

- 本细胞中目的基因的敲除已经通过T7EI法的验证。
- 由于本细胞是通过CRISPR/Cas9技术获得的多克隆细胞，基于CRISPR/Cas9技术的特点，理论上平均有2/3的细胞发生移码突变而导致了目的基因的敲除，平均有1/3的细胞并未发生移码突变。很多情况下有约2/3的细胞发生目的基因的敲除，已经足以进行很多的目的基因的生物学功能的研究了。如果希望获得100%基因敲除的细胞，可以自行使用本产品筛选单克隆细胞，或者委托碧云天进行单克隆细胞株的筛选服务。
- 本细胞用于实验时，建议同时选购无任何靶向的对照细胞Control Knockout HEK293T Cells (L00020)或靶向GFP的对照细胞GFP Knockout HEK293T Cells (L00022)。
- 碧云天同时提供基于CRISPR/Cas9技术的NUPR1基因敲除的质粒(L29265 pLenti-NUPR1-sgRNA)、慢病毒(L29266 NUPR1 Knockout Lentivirus)、HEK293T细胞(L29267 NUPR1 Knockout HEK293T Cells)、HEK293T敲除细胞的RIPA裂解液(L29268 NUPR1 Knockout HEK293T RIPA Lysate)、HEK293T敲除细胞的Trizol裂解液(L29269 NUPR1 Knockout HEK293T Trizol Lysate)等产品，具体请在碧云天网站查询或在本产品网页点击相应产品。
- NUPR1基因的基本信息如下：

Species	Gene Symbol	Gene ID	GenBank Accession	Transcript
Human	NUPR1	26471	BC002434	NM_012385

About the gene	
Official Symbol	NUPR1
Previous Symbol	-
Official Full Name	nuclear protein 1, transcriptional regulator
Synonyms	COM1; p8
Location	16p11.2
Gene Type	protein-coding gene
Uniprot ID	O60356
Pathway/Library	others
Gene Summary	Transcription regulator that converts stress signals into a program of gene expression that empowers cells with resistance to the stress induced by a change in their microenvironment. Thereby participates in regulation of many process namely cell-cycle, apoptosis, autophagy and DNA repair responses (PubMed:16478804, PubMed:19650074, PubMed:16300740, PubMed:19723804, PubMed:11056169, PubMed:22858377, PubMed:11940591, PubMed:18690848, PubMed:22565310, PubMed:20181828, PubMed:30451898). Controls cell cycle progression and protects cells from genotoxic stress induced by doxorubicin through the complex formation with TP53 and EP300 that binds CDKN1A promoter leading to transcriptional induction of CDKN1A (PubMed:18690848). Protects pancreatic cancer cells from stress-induced cell death by binding the RELB promoter and activating its transcription, leading to IER3

	transactivation (PubMed:22565310). Negatively regulates apoptosis through interaction with PTMA (PubMed:16478804). Inhibits autophagy-induced apoptosis in cardiac cells through FOXO3 interaction, inducing cytoplasmic translocation of FOXO3 thereby preventing the FOXO3 association with the pro-autophagic BNIP3 promoter (PubMed:20181828). Inhibits cell growth and facilitates programmed cell death by apoptosis after adriamycin-induced DNA damage through transactivation of TP53 (By similarity). Regulates methamphetamine-induced apoptosis and autophagy through DDIT3-mediated endoplasmic reticulum stress pathway (By similarity). Participates in DNA repair following gamma-irradiation by facilitating DNA access of the transcription machinery through interaction with MSL1 leading to inhibition of histone H4' Lys-16' acetylation (H4K16ac) (PubMed:19650074). Coactivator of PAX2 transcription factor activity, both by recruiting EP300 to increase PAX2 transcription factor activity and by binding PAXIP1 to suppress PAXIP1-induced inhibition on PAX2 (PubMed:11940591). Positively regulates cell cycle progression through interaction with COPS5 inducing cytoplasmic translocation of CDKN1B leading to the CDKN1B degradation (PubMed:16300740). Coordinates, through its interaction with EP300, the association of MYOD1, EP300 and DDX5 to the MYOG promoter, leading to inhibition of cell-cycle progression and myogenic differentiation promotion (PubMed:19723804). Negatively regulates beta cell proliferation via inhibition of cell-cycle regulatory genes expression through the suppression of their promoter activities (By similarity). Also required for LHB expression and ovarian maturation (By similarity). Exacerbates CNS inflammation and demyelination upon cuprizone treatment (By similarity). NUPR1_HUMAN,O60356
--	---

## 包装清单：

产品编号	产品名称	包装
L29267	NUPR1 Knockout HEK293T Cells	1支/瓶
—	说明书	1份

## 保存条件：

对于细胞培养瓶或离心管运输的活细胞，室温3-5天有效；对于干冰运输的冻存细胞，液氮保存，长期有效。

## 注意事项：

- 碧云天拥有sgRNA序列的知识产权，如果需要sgRNA序列，请在订购后发送邮件向info@beyotime.com索取。sgRNA序列信息与本细胞，未经碧云天书面许可不得用于任何商业用途，也不得移交给订货人所在实验室外的任何个人或单位。使用者在发表研究论文或结果时，应注明来源。
- 对于本细胞的单克隆细胞株筛选或非HEK293T细胞的CRISPR基因敲除细胞的定制，可联系碧云天技术服务service@beyotime.com。
- 本产品仅限于专业人员的科学的研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

## 使用说明：

### 1. HEK293T细胞的运输、复苏及培养：

- a. 本HEK293T Cells为同时表目的基因sgRNA、Cas9和puromycin抗性的慢病毒感染并经过puromycin筛选和T7EI鉴定的多克隆HEK293T细胞。
- b. 本细胞会根据细胞是否正在培养、目的地距离等因素确定运输方式：冷冻的细胞冻存管(干冰)、一小瓶贴壁培养的细胞或一小瓶/管悬浮培养的细胞(常温)。为了更好地耐受长途运输和环境温度等变化，对于正常贴壁培养的细胞，也可能可能会以悬浮的形式培养在细胞培养瓶或离心管中进行运输。
- c. 对于干冰运输的冻存细胞，若干冰已经完全融化，请立即将细胞复苏培养，切勿再次低温冻存；若尚留有干冰，请直接复苏培养或立即将含有细胞的冻存管放入液氮中保存待用，切不可将细胞置于高温环境。
- d. 收到冻存的细胞后请尽快复苏细胞进行培养，以确认细胞活力、状态并保种。如暂时不进行复苏操作，冻存细胞可在-80°C条件下保存2个月。
- e. 每支冻存管约含1×10<sup>6</sup>个细胞，体积为0.5-1ml，预期存活率60-90%，建议复苏至1个6cm培养皿中。如果复苏后存活率较低，可以消化后转移至3.5cm培养皿中，这样细胞生长会更好。
- f. 如果本细胞是常温运输，并且是培养瓶中充满完全培养液的贴壁细胞，收到细胞后请在显微镜下观察细胞生长状态，如果细胞密度超过85%请尽快进行传代操作；如果悬浮的细胞较多，请将培养瓶置于培养箱中静置过夜以使悬浮的细胞再次贴壁。如果收到的是常温运输的离心管装的悬浮细胞，可以直接取出转移至培养皿或培养瓶中培养。若培养液颜色正常则保留培养液继续培养，并且在首次更换培养液时，保留一半原培养液，并加入一半新鲜培养液，这样可以尽量避免由于培养液或血清差异导致细胞生长的不适应，确保细胞良好的生长状态。
- g. 本细胞的培养液为DMEM (high glucose)+10% FBS。请在培养液中加入适量青霉素-链霉素溶液以防止可能的细菌污染，如碧云天的青霉素-链霉素溶液(100X) (C0222)。同时，加入终浓度为1μg/ml的Puromycin (ST551)。未感染慢病毒的HEK293T细胞的具体信息请参考293T (人胚肾细胞) (C6008)：<https://www.beyotime.com/product/C6008.htm>。
- h. 如果有必要，后续可以通过将细胞稀释至2.5个/ml，然后按照每孔200μl接种到96孔板中(每孔平均0.5个细胞)，筛选单克

隆细胞株。

## 2. 基因编辑的鉴定：

- a. 对于多克隆细胞，可以通过T7 Endonuclease I (T7EI)进行鉴定，即提取细胞的基因组DNA，在sgRNA序列两侧设计引物进行PCR扩增，然后进行T7EI酶切和电泳分析，具体请参考碧云天的基因组编辑突变检测试剂盒(D0508)或T7 Endonuclease I (CRISPR等基因突变鉴定用) (D7080)；也可以通过目的基因的抗体进行检测。注意：由于CRISPR基因敲除通常是仅若干个碱基的缺失突变，不适合通过qRT-PCR对目的基因的mRNA进行定量检测来判断是否实现了目的基因的敲除。
- b. 对于单克隆细胞，可通过PCR扩增出sgRNA靶向的基因片段后进行常规测序的方式进行验证，同时也可使用相应的抗体进行检测。本产品也可以通过进一步筛选单克隆细胞株后进行基因编辑的鉴定以及后续的生物学功能研究。

## 相关产品：

产品编号	产品名称	包装
L00020	Control Knockout HEK293T Cells	1支/瓶
L00022	GFP Knockout HEK293T Cells	1支/瓶
C0222	青霉素-链霉素溶液(100X)	100ml
D0508S/M	基因组编辑突变检测试剂盒	25/100次
D7080S/M/L	T7 Endonuclease I (CRISPR等基因突变鉴定用)	250/1250/5000U
ST551-10mg	Puromycin Dihydrochloride (嘌呤霉素)	10mg/ml×1ml
ST551-50mg	Puromycin Dihydrochloride (嘌呤霉素)	10mg/ml×5ml
ST551-250mg	Puromycin Dihydrochloride (嘌呤霉素)	250mg

Version 2020.12.08