


贝母素乙(98%, HPLC)

产品编号	产品名称	包装
SM4036-10mM	贝母素乙(98%, HPLC)	10mM×0.2ml
SM4036-5mg	贝母素乙(98%, HPLC)	5mg
SM4036-25mg	贝母素乙(98%, HPLC)	25mg
SM4036-100mg	贝母素乙(98%, HPLC)	100mg

产品简介:

➤ 化学信息:

中文名	贝母素乙
英文名	Peiminine
中文别名	贝母乙素; 浙贝乙素; 贝母宁碱; 去氢贝母碱; 浙贝乙素; 去氢浙贝母碱
英文别名	Verticinone; Fritillarine; Raddeanine
来源	湖北贝母 <i>Fritillaria hupehensis</i> Hsiao et K. C. Hsia
化合物类型	生物碱(Alkaloids)>喹诺里西啶类生物碱
化学式	C ₂₇ H ₄₃ NO ₃
分子量	429.64
CAS号	18059-10-4
纯度	98%, HPLC
溶剂/溶解度	DMSO: ≥ 100 mg/ml (232.75 mM)
溶液配制	5mg加入1.16ml DMSO, 或者每4.30mg加入1ml DMSO, 配制成10mM溶液。



➤ 生物信息

产品描述	Peiminine(Verticinone; Raddeanine) is a natural compound with anti-inflammatory activity.				
信号通路	TGF-β; CTGF; ERK1/2; NF-κB; FasL				
靶点	IFN-γ	-	-	-	-
IC ₅₀	-	-	-	-	-
体外研究	Peiminine and DXS significantly reduced alveolar inflammation and pulmonary interstitial inflammation in rats with bleomycin-induced lung injury. peiminine inhibits lung inflammation and pulmonary fibrosis in a rat model of bleomycin-induced lung injury, by reducing circulating IFN-γ levels and inhibiting signal transduction pathways involving TGF-β, CTGF, ERK1/2, NF-κB and FasL.				
体内研究	N/A				
临床实验	N/A				

参考文献:

- Guo H, et al. Mol Med Rep. 2013,7(4):1103-10.

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
SM4036-10mM	贝母素乙(98%, HPLC)	10mM×0.2ml
SM4036-5mg	贝母素乙(98%, HPLC)	5mg
SM4036-25mg	贝母素乙(98%, HPLC)	25mg
SM4036-100mg	贝母素乙(98%, HPLC)	100mg
-	说明书	1份

保存条件：

-20°C保存，至少一年有效。固体粉末4°C保存，至少一个月有效。如果溶于非DMSO溶剂，建议分装后-80°C保存，预计6个月内有效。

注意事项：

- 本产品可能对人体有一定的毒害作用，请注意适当防护，以避免直接接触人体或吸入体内。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明：

1. 收到产品后请立即按照说明书推荐的条件保存。使用前可以在2,000-10,000g离心数秒，以使液体或粉末充分沉降至管底后再开盖使用。
2. 对于10mM溶液，可直接稀释使用。对于固体，请根据本产品的溶解性及实验目的选择相应溶剂配制高浓度的储备液(母液)后使用。
3. 具体的最佳工作浓度请参考本说明书中的体外、体内研究结果或其它相关文献，或者根据实验目的，以及所培养的特定细胞和组织，通过实验进行摸索和优化。
4. 不同实验动物依据体表面积等效剂量转换表请参考如下网页：
<https://www.beyotime.com/support/animal-dose.htm>

Version 2021.05.13