



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology  
订货热线: 400-1683301 或 800-8283301  
订货 e-mail: order@beyotime.com  
技术咨询: info@beyotime.com  
网址: http://www.beyotime.com

## Zeocin (博莱霉素)

产品编号	产品名称	包装
ST1450-20mg	Zeocin (博莱霉素)	20mg
ST1450-100mg	Zeocin (博莱霉素)	100mg
ST1450-0.25ml	Zeocin (博莱霉素)	20mg/ml × 0.25ml
ST1450-1ml	Zeocin (博莱霉素)	20mg/ml × 1ml

### 产品简介:

- Zeocin即phleomycin D1，中文名称博来霉素或者腐草霉素D1，是从轮状链霉菌(*Streptomyces verticillus*)的一个突变体菌株中分离而来的博来霉素/腐草霉素(bleomycin/phleomycin)的抗生素家族成员。它对细菌、真菌(包括酵母)、植物和哺乳动物细胞均有抑制作用和细胞毒性。
- Zeocin是一种碱性、水溶性的、铜离子螯合的糖肽抗生素。Cu<sup>2+</sup>螯合的Zeocin溶液呈现蓝色，无活性。当其进入细胞后，Zeocin上的Cu<sup>2+</sup>被还原为一价铜离子(Cu<sup>+</sup>)，并被细胞内的巯基化合物(sulfhydryl compound)清除，导致Zeocin被活化，能够结合到细胞内DNA上并使其断裂，最终导致细胞死亡。
- 对Zeocin产生抗性的蛋白是来源于印度链球菌(*Streptoalloteichus hindustanus*)的Sh ble基因编码一种14kDa大小的蛋白，它能够以一定比率结合Zeocin，使其不能结合细胞DNA，抑制其DNA断裂活性，从而使细胞对Zeocin产生抗性。因此，Zeocin可用来筛选表达Zeocin抗性基因的多克隆或单克隆细胞，或用于相应的多克隆或单克隆细胞的维持性培养。
- Zeocin对于绝大多数好氧细胞均有效，常用于细菌(如大肠杆菌)、真核微生物(如酵母)及动植物细胞的筛选。大肠杆菌筛选推荐浓度为25~50μg/ml (低盐LB培养基，NaCl浓度不能超过5g/L)；酵母筛选推荐浓度为50~300ug/ml (YPD或基本培养基)；哺乳动物细胞筛选推荐浓度为50~1000ug/ml (合适培养基，根据细胞系的类型而不同)。实际应用时，应针对不同的细胞系测试Zeocin的浓度梯度，以确定最佳使用浓度。

### 化学性质:

化学名	(7R)-N1-[4-[[Amino(imino)methyl]amino]butyl]-7,8-dihydrobleomycinamide	
化学式	C <sub>55</sub> H <sub>85</sub> O <sub>21</sub> N <sub>20</sub> S <sub>2</sub> Cu	
CAS 号	11006-33-0	
纯度	BioReagent, ≥80%	
分子量	1474.03	
溶解性	H <sub>2</sub> O: 50 mg/mL	

- 本产品溶液包装配制在去离子水中，浓度为20mg/ml，经0.22μm滤膜过滤除菌，可以直接用于细胞培养。

### 包装清单:

产品编号	产品名称	包装
ST1450-20mg	Zeocin (博莱霉素)	20mg
ST1450-100mg	Zeocin (博莱霉素)	100mg
ST1450-0.25ml	Zeocin (博莱霉素)	20mg/ml × 0.25ml
ST1450-1ml	Zeocin (博莱霉素)	20mg/ml × 1ml
—	说明书	1份

### 保存条件:

-20°C避光保存，至少一年有效。20mg/ml溶液包装适当避免反复冻融。

### 注意事项:

- Zeocin 人体有害，操作时请小心，并注意有效防护以避免直接接触人体或吸入体内。
- Zeocin 对光敏感，需避光保存于-20°C。含有该抗生素的平板或培养基也需避光保存。
- 高离子强度、酸或碱性都会抑制 Zeocin 的活性，该抗生素在过高或过低 pH 及弱氧化剂的条件下不稳定，且变性不可逆。在培养细菌时，需适当降低细菌培养基的盐浓度(低盐 LB 培养基，NaCl 浓度不能超过 5g/L)并调整 pH 至 7.5，从而使其保持活性。
- 本产品仅限于专业人员的科学的研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。

➤ 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

## 使用说明:

### 1. 细菌的筛选(以大肠杆菌为例)。

- 使用不含Tn5转座子元件的宿主细胞如Top10、DH5和DH10等进行筛选
- 需使用低盐LB培养基(10g胰蛋白胨, 5g NaCl, 5g酵母提取物, 调整pH至7.5, 加水定容至1L)以维持Zeocin的活性。
- Zeocin筛选的推荐浓度为25~50 $\mu$ g/ml。

### 2. 真菌的筛选(以酵母为例)。

- 适用于酿酒酵母和毕赤酵母。
- 培养基的选择: 含1M山梨醇的YPD培养基(适用于电穿孔法转染细胞); YPD或基本培养基(适用于化学法转染细胞)。调整培养基pH至6.5~8.0, 并选择使用最低有效浓度的Zeocin进行筛选。
- 转染方法: 需使用电穿孔或锂离子转染法。不要使用酵母原生质球(spheroplasting)进行Zeocin抗性的转染及筛选, 因为Zeocin会导致原生质球的完全死亡。
- Zeocin筛选的推荐浓度为50~300 $\mu$ g/ml。具体浓度与酵母菌株、培养基pH以及离子强度有关。

### 3. 哺乳动物稳定表达细胞株的筛选。

Zeocin用于哺乳动物细胞筛选常用浓度为50-1000 $\mu$ g/ml (平均常用浓度为250-400 $\mu$ g/ml)。影响筛选浓度的主要因素包括离子强度、细胞类型、细胞生长密度以及生长速率。根据细胞类型的不同, 需要1-2周可以筛选到Zeocin抗性的细胞。在筛选稳定表达细胞株之前, 需要先确定能够杀死未转染细胞的Zeocin最佳工作浓度。Zeocin的最佳工作浓度需要通过剂量效应曲线来确定。下表中列出了部分细胞中Zeocin的筛选浓度范围以供参考。

表1. 部分常见哺乳动物细胞的Zeocin推荐筛选浓度表

Cell Type	Culture Medium	Zeocin Concentration
B16 (Mouse melanocytes)	RPMI	20-250 $\mu$ g/ml
CHO (Chinese hamster ovarian cells)	DMEM	100-500 $\mu$ g/ml
COS (Monkey kidney cells)	DMEM	100-400 $\mu$ g/ml
HEK293 (Human embryonic kidney cells)	DMEM	100-400 $\mu$ g/ml
HeLa (Human uterine cells)	DMEM	50-100 $\mu$ g/ml
J558L (Mouse melanocytes)	RPMI	400 $\mu$ g/ml
MCF-7 (Human breast adenocarcinoma cells)	DMEM	100-400 $\mu$ g/ml
MEFs (Mouse embryonic fibroblasts)	DMEM	200-400 $\mu$ g/ml
THP-1 (Human monocytes)	RPMI	200 $\mu$ g/ml

#### a. 细胞对Zeocin敏感性的确定(杀灭曲线的建立)。

- 接种细胞使得细胞密度约为25%, 按照8、16或24个细胞培养孔(分别为单个培养孔、复孔和三复孔)准备培养的细胞, 培养24h。
- 去除细胞培养液, 换成含不同浓度Zeocin的新鲜筛选培养液(0, 50, 100, 200, 400, 600, 800和1000 $\mu$ g/ml)。
- 每2-4天更换新鲜的筛选培养液, 观察存活细胞的比例, 选择在1-2周内杀死所有细胞的最低浓度作为最佳工作浓度。

#### b. 筛选Zeocin抗性的稳定细胞株。

- 按照20%-30%的细胞密度接种细胞, 培养过夜。
- 转染携带Zeocin抗性基因的质粒或感染携带Zeocin抗性基因的病毒, 同时设置没有转染质粒或感染病毒的细胞作为对照。

**说明:** 没有转染质粒或感染病毒的细胞, 也需要同样进行转染质粒或感染病毒的相应实验操作。

- 转染或感染48-72h后, 换成含有最佳工作浓度的Zeocin (由步骤a中的杀灭曲线确定)的新鲜培养液, 继续培养。如果有必要, 可以对细胞进行传代, 略稀释后进行筛选培养。

- 每2-4天更换含有Zeocin的新鲜筛选培养液。

- 对照组正常细胞100%死亡, Zeocin抗性组中存活的细胞即为表达Zeocin抗性基因的细胞。然后根据实验目的进行多克隆或单克隆细胞的筛选。根据细胞种类和转染/筛选效率, 单克隆细胞株的形成可能需要一周或更多的时间。

**注意:** 若待筛选细胞对Zeocin的抗性明显强于大部分细胞, 则按照以下方法克服此类耐受性: 用含Zeocin培养液进行细胞接种培养, 置于37°C孵育2-3h, 使得细胞贴壁。然后将细胞置于4°C, 2h。需要使用HEPES作为培养基的缓冲体系。重新将细胞置于37°C孵育。4°C孵育细胞的目的是短时间内终止细胞分化, 使得Zeocin能发挥作用, 杀死细胞。

#### c. 稳定细胞株的维持培养

可采取如下几种方式之一来维持培养稳定细胞株。

- 使用含有与上述筛选稳定转染细胞株相同浓度的Zeocin筛选培养液来维持培养。
- 降低Zeocin浓度为筛选浓度的一半进行维持培养。
- 使用刚好能预防敏感细胞生长但不足以致死的Zeocin浓度来维持培养(根据杀灭曲线来判断)。

## 相关产品:

产品编号	产品名称	包装
ST018-1ml	Blasticidin S HCl (灭瘤素S)	10mg/ml×1ml

ST018-5ml	Blasticidin S HCl (灭瘟素S)	10mg/ml×5ml
ST018-10mg	Blasticidin S HCl (灭瘟素S)	10mg
ST018-50mg	Blasticidin S HCl (灭瘟素S)	50mg
ST039A	Doxycycline hyclate(盐酸强力霉素)	1g
ST039B	Doxycycline hyclate(盐酸强力霉素)	50g
ST081-1g	G-418 (遗传霉素)	1g
ST081-5g	G-418 (遗传霉素)	5g
ST551-10mg	Puromycin Dihydrochloride (嘌呤霉素)	10mg/ml×1ml
ST551-50mg	Puromycin Dihydrochloride (嘌呤霉素)	10mg/ml×5ml
ST551-250mg	Puromycin Dihydrochloride (嘌呤霉素)	250mg
ST1389-50mg	Hygromycin B(潮霉素B)	50mg
ST1389-250mg	Hygromycin B(潮霉素B)	250mg
ST1389-1g	Hygromycin B(潮霉素B)	1g
ST1389-5g	Hygromycin B(潮霉素B)	5g
ST1450-20mg	Zeocin (博莱霉素)	20mg
ST1450-100mg	Zeocin (博莱霉素)	100mg
ST1450-0.25ml	Zeocin (博莱霉素)	20mg/ml×0.25ml
ST1450-1ml	Zeocin (博莱霉素)	20mg/ml×1ml

Version 2023.10.31